

## **SEZNAM LÉKŮ, KTERÉ PACIENT S PARKINSONOVOU NEMOCÍ NESMÍ DOSTAT**

V následujícím textu nejsou uvedeny veškeré léky, které mohou průběh nemoci či stav hybnosti u Parkinsonovy nemoci výrazněji zhoršit. Uvádíme zde jen léky nejčastěji užívané v České republice, se kterými může pacient s Parkinsonovou nemocí v ordinacích českých lékařů eventuálně přijít do styku.

- **Antipsychotika/Neuroleptika (tzv. typická)** – léky používané hlavně, ale ne vždy, v léčbě duševních poruch: např. Haloperidol, Haldol, Largactil, Moditen, Tisercin, Levopromazin, Prochlorperazin, Perfenazin,
- **Některé léky používané při zažívacích obtížích:**  
Degan
- **Některé léky používané např. v léčbě závratí, nevolnosti, zvracení:**  
Torecan
- **Některé léky používané např. při nedostatečném prokrvení vnitřního ucha či mozku:**  
Stugeron, Cinnabene, Cinarizin, Arlevert, Sibelium
- **Některé léky, používané k tlumení kašle, škytavky:**  
Prothazin, Promethazin, Phenergan
- **Některé léky používané v léčbě vyššího krevního tlaku:**  
Crystepin, Aldomet, Dopamet, Dopegyt
- **Současně se selegilem (Jumex, Sepatrem, Niar atd.) se nesmějí používat léky s antidepressivním účinkem.** Tyto léky lze pacientům s Parkinsonovou nemocí podávat, je však nutno předem vysadit selegilin, a to asi 3 týdny před nasazením antidepressiva.